

# BEVORSTEHENDE GEBURT / GEBURTSBEGLEITUNG

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmien

## Bevorstehende Geburt

- **Wehentätigkeit > 2 min**
- Vorzeitiger Blasensprung + Wehen

**i.V.-Zugang und Infusion**

### Versorgung nach rettungsdienstlichem Standard

- Mutterpass einsehen und mitnehmen
- Lagerung in bequemer Position oder situationsgerecht
- **Vorsicht: Vena-Cava-Kompressionssyndrom**

### Geburtshilfliche Notfallanamnese:

- Anzahl der vorangegangenen Schwangerschaften und Geburten
- Schwangerschaftsverlauf
- Zeitgerechte + normale Kindsentwicklung
- Geburtshilfliche Symptomatik (Schmerzen, Blutung, Wehentätigkeit, [vorzeitiger] Blasensprung, Fruchtwasserfarbe)
- Geburtsmodus vorangegangener Geburten (Spontangeburt, Kaiserschnitt, ...)
- Komplikationen vorangegangener Geburten / gynäkologische Voroperationen

**Notfalltransport in den Kreißsaal**

## Einsetzende Geburt

- Vorangehender Kindskopf in der Vulva sichtbar
- Presswehen, Pressdrang
- Abdominelle Schmerzen
- Wehentätigkeit < 2 min
- Klaffen des Anus
- ggf. Blutabgang
- ggf. Flüssigkeitsabgang

**i.V.-Zugang und Infusion**

### Versorgung nach rettungsdienstlichem Standard

- Mutterpass einsehen und mitnehmen

### Informationen aus dem Mutterpass

- Kindslage im Mutterpass nachschauen:

**SL = Schädellage**

**Geburt vor Ort möglich**

**2. RTW erforderlich?**

**Kein Transport – Geburt vor Ort**

**Algorithmus Neugeborenenversorgung**

**Keine Geburt vor Ort möglich:**

QL = Querlage  
Placenta praevia  
Nabelschnurvorfall  
**Geburt vor Ort nicht anzustreben:**  
BEL = Beckenendlage

**Algorithmus Partusisten-Gabe**