### **BEVORSTEHENDE GEBURT / GEBURTSBEGLEITUNG**

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmen Mutterpass einsehen und mitnehmen

### i.V.-Zugang und Infusion

#### **Bevorstehende Geburt**

- Wehentätigkeit > 2 min
- Vorzeitiger Blasensprung + Wehen

# Versorgung nach rettungsdienstlichem Standard

- Lagerung in bequemer Position oder situationsgerecht
- Vorsicht: Vena-Cava-Kompressionssyndrom

### Einsetzende Geburt

- Vorangehender Kindskopf in der Vulva sichtbar
- Presswehen, Pressdrang
- Abdominelle Schmerzen
- Wehentätigkeit < 2 min
- Klaffen des Anus
- ggf. Blutabgang
- ggf. Flüssigkeitsabgang

### Versorgung nach rettungsdienstlichem Standard

• Kindslage im Mutterpass nachschauen:

### Geburtshilfliche Notfallanamnese:

- Anzahl der vorangegangenen Schwangerschaften und Geburten
- Schwangerschaftsverlauf
- Zeitgerechte + normale Kindsentwicklung
- Geburtshilfliche Symptomatik (Schmerzen, Blutung, Wehentätigkeit, [vorzeitiger]
   Blasensprung, Fruchtwasserfarbe)
- Geburtsmodus vorangegangener Geburten (Spontangeburt, Kaiserschnitt, ...)
- Komplikationen vorangegangener GeburtenGeburtshilfliche / gynäkologische Voroperationen

### SL = Schädellage

Geburt vor Ort möglich

### 2. RTW erforderlich?

## Keine Geburt vor Ort möglich:

QL = Querlage
Placenta praevia
Nabelschnurvorfall
Geburt vor Ort nicht
anzustreben:

BEL = Beckenendlage

1

Algorithmus Partusisten-Gabe

Notfalltransport in den Kreißsaal

Kein Transport - Geburt vor Ort



Algorithmus Neugeborenenversorgung