

# ANLAGE B2B - ÜBERSICHT DER DOSIERUNGSTABELLEN AUS DEN VERFAHRENSANWEISUNGEN

## 30 – Krampfanfall Kinder > 30 kg – Midazolam

Körpergewicht	3	6	10	14	16	18	20	22	24	26	28	30
ml	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

Dosierungstabelle Midazolam (Menge mit 0,1 ml zusätzlich für Totraum MAD berechnet, gerundet und altersangepasst)

## 36 - Starke Schmerzzustände Erwachsene und Kinder > 30 kg – Esketamin

Körpergewicht	kg	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
0,2 mg/kg/KG	mg	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Esketamin i.v. 5 mg/ml	ml	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4

Die Tabelle bezieht sich auf die Verdünnungsempfehlung in Anlage B2.

## 37 – Starke Schmerzzustände Kinder < 30 kg - Esketamin

Körpergewicht	kg	5	10	15	20	25	30	35	40
i.v.	mg	1	2	3	4	5	6	7	8
0,2 mg/kg/KG	ml	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6
i.m.	mg	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20
0,5 mg/kg/KG	ml	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
i.n./MAD	mg	5	10	15	20	25	30	35	40
1 mg/kg/KG	ml	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6

Die Tabelle bezieht sich auf die Verdünnungsempfehlung in Anlage B2.

## 38 – Starke Schmerzzustände – Morphin

Körpergewicht	40	50	60	70	80	90	100	110
mg	2	2	3	3	4	4	5	5

Dosierungstabelle Morphin (verdünnt i.v.) bezogen auf die Verdünnungsempfehlung in Anlage B